

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ РАСТВОР

Регистрационный номер: ЛСР-008825/08

Торговое название. Медицинский антисептический раствор

Международное непатентованное или группировочное название. Этанол

Химическое название. Этиловый спирт.

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения.

Состав: смесь спирта с водой, содержащая по объему 95% этилового спирта.

Описание: прозрачная бесцветная подвижная летучая жидкость с характерным спиртовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептическое средство.

Код АТХ. [D08AX08].

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, лучше проникающий в более глубокие слои эпидермиса, чем 95 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяют в качестве антисептического и дезинфицирующего средства (обработка медицинского инструментария, рук хирурга и операционного поля) и местнораздражающего средства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно, в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор.

95 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.

В качестве раздражающего средства – в виде обтираний и компрессов.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции, ожоги кожи, покраснение и болезненность кожи в месте компресса.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для наружного применения 95 %.

По 25 мл, 50 мл, 100 мл во флаконы бесцветного или светозащитного стекла, закупоренные пробками из полиэтилена или крышками из полиэтилена или колпачками алюминиевыми или другими закупорочными средствами.

По 100 мл во флаконы из полиэтилена в комплекте с крышкой с контрольным

вскрытием.

По 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 21,5 л, 31,5 л в канистры из полимерных материалов или из полиэтилена низкого давления. (Для стационаров).

На каждый флакон или канистру наклеивают этикетку из бумаги или самоклеющуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 70 флаконов с инструкцией по применению помещают в коробку из картона. (Для стационаров).

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25°C, в герметичной упаковке, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

По рецепту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИНИМАЮЩЕЕ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса мест производства:

1. ЗАО «Фармацевтический Комбинат», Россия, 301848, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Московская застава, д.1.

Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «Фармацевтический Комбинат», Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.33/1, стр. 14. Телефон/факс (495) 786-07-63

2. ЗАО «РФК», Россия, 303665, Орловская область, Краснозоренский район, с. Верхняя Любовша.

3. ЗАО «РФК», Россия, 303657, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Ключики.

Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «РФК», Россия, 125438, г. Москва, ул. Войкова, дом 6, стр. 22.

Телефон/факс (495) 649-92-61.