

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ НАСТОЙКА

Регистрационный номер

Торговое название: Пиона уклоняющегося настойка

Международное непатентованное наименование: Пиона уклоняющегося трава, корневища и корни.

Лекарственная форма: Настойка

Для получения препарата используют:

Пиона уклоняющегося трава - 50 г

Пиона уклоняющегося корневища и корни – 50 г

Этанол (спирт этиловый) 40% - достаточное количество до получения 1000 мл настойки

Описание

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ N05CM.

Фармакологические свойства

Оказывает седативное действие на центральную нервную систему.

Показания к применению

Настойку пиона применяют в качестве седативного средства при нарушениях сна, повышенной нервной возбудимости, вегето-сосудистых нарушениях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная и/или почечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью - при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутри по 30-40 капель на прием 3 раза в день в течение 25-30 дней. Курс может быть повторен после 10-дневного перерыва, после консультации с врачом.

Побочное действие

В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Настойка пиона уклоняющегося способствует ослаблению эффекта средств, тонизирующих центральную нервную систему; потенцирует действие снотворных, седативных средств, спазмолитиков.

Особые указания

Максимальная разовая доза препарата содержит 0,43 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза препарата - 1,4 г абсолютного спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Настойка.

По 25, 50, 100 мл во флаконы-капельницы бесцветного или светозащитного стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

По 25, 50, 100 мл во флаконы бесцветного или светозащитного стекла, укупоренные пробками из полиэтилена или крышками из полиэтилена или колпачками алюминиевыми.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары или картона хром-эрзац макулатурного мелованного.

Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по применению лекарственного препарата помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из картона (для стационаров или производственных отделов аптек).

По 0.5 л, 1 л, 3 л, 5 л в канистры полиэтиленовые (для стационаров или производственных отделов аптек).

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15° до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Организация, принимающая претензии

ЗАО «РФК»: Россия,

125438, г. Москва, ул. Войкова, дом 6, стр. 22.

Телефон/факс (495) 649-92-61.

Адрес производства

1. ЗАО «РФК», Россия,

303665, Орловская область, Краснозоренский район, с. Верхняя Любовша.

2. ЗАО «РФК», Россия,

303657, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Ключики.